



ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ປະຈຳ ອາທິດວັນທີ 06 ຫາ 10 ມີນາ 2023



ກາກມັນຕົ້ນໝັກຢືສ ສຳລັບເປັນອາຫານສັດ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນຊ່ວຍຊາວກະສິກອນ

ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້



ກາກມັນຕົ້ນໝັກຢືສ ສຳລັບເປັນອາຫານສັດ ທາງເລືອກເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນແກ່ຊາວກະສິກອນ

ວາລະສານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະບັບ ນີ້ ຂໍນຳສະເໜີ ການເຮັດອາຫານສຳລັບສັດ ເພື່ອຊ່ວຍ ລົດຕົ້ນທຶນໃນຍາມສະພາວະທີ່ຄ່າທຳອາຫານສັດທີ່ ມີແນວໂນ້ມແພງຂຶ້ນຢ່າງໃນປັດຈຸບັນ ຫຼາຍທ່ານອາດ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລອງໃຊ້ວ່າດີ ແລະ ມີ ປະໂຫຍດແນວໃດ ສະນັ້ນ, ເຮົາມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກ ກັບການເຮັດກາກມັນຕົ້ນໝັກ

ກາກມັນຕົ້ນ ແມ່ນຜົນພອຍໄດ້ຈາກຂະບວນ ການຜະລິດແບັງມັນຕົ້ນ ອາດຢູ່ໃນສະພາບປຽກ ຫຼື ແຫ້ງ (ຜົງ ແລະ ອັດເມັດ), ເຊິ່ງຍັງມີຄຸນຄ່າທາງ ອາຫານຢູ່ໂດຍສະເພາະໃນສ່ວນທີ່ເປັນຄາໂບໄຮ ເດຣດ ທີ່ຍ່ອຍງ່າຍປະມານ 65-70% ສາມາດນຳ ມາໃຊ້ເປັນວັດຖຸດິບອາຫານສັດໄດ້.

ຢືສ Yeast ຈຸລິນຊີ ຈຳພວກເຊື້ອຣາ ມີຢູ່ຫຼາຍ ສາຍພັນ ເຊັ່ນ ຢືສໝັກເຫຼົ້າ, ໝັກວາຍ, ເຮັດເຂົ້າໜົມ ປັງ ແລະ ອື່ນໆ

ວັດຖຸດິບ ແລະ ອຸປະກອນ ການເຮັດກາກມັນ ຕົ້ນໝັກຢືສປະກອບມີ:

1. ກາກມັນຕົ້ນ 1.000 ກິໂລກຼາມ;
2. ນ້ຳຕານ 1 ກິໂລກຼາມ;
3. ກາກນ້ຳຕານ 10 ລິດ;
4. ຜົງຢືສ 0,5 ກິໂລກຼາມ;
5. ປຸ່ຍຢູເຣຍ (00-46-00) 5 ກິໂລກຼາມ;
(ຖ້າຈະໃຫ້ງົວພໍ້ແມ່ພັນກິນ ແມ່ນບໍ່ຄວນໃສ່)
6. ຖົງໃສ່ນ້ຳ ຂະໜາດ 200 ລິດ;
7. ຖົງໃສ່ນ້ຳ ຂະໜາດ 20 ລິດ;
8. ຖົງຢາງດຳ 35 ຖົງ ແລະ ເປົາ 35 ໜ່ວຍ;
9. ຊ້ວນ ແລະ ອຸປະກອນ ຮັບໃຊ້ອື່ນໆ;

ຂັ້ນຕອນຂະບວນການການຜະລິດ

1. ຂັ້ນຕອນການກະຕຸ້ນຢືສ: ໂດຍໃຫ້ນ້ຳນ້ຳຕານ 1 ກິໂລກຼາມ ມາລະລາຍໃນນ້ຳສະອາດ 10 ລິດ ຄົນ ໃຫ້ລະລາຍດີແລ້ວໃສ່ຢືສ 0,5 ກິໂລກຼາມ ປະສົມໃຫ້



ເຂົ້າກັນດີປະໄວ້ປະມານ 10-20 ນາທີ ຫຼື ຈົນຢືດ ເກີດ ເປັນຟອງຂຶ້ນ.

2. ຂັ້ນຕອນການກະກຽມອາຫານຢືດ: ລະລາຍ ບຸ່ຍຢູເຣຍ 5 ກິໂລກຼາມ ແລະ ກາກນ້ຳຕານ 10 ລິດ ໃນນ້ຳສະອາດ 100 ລິດ ໃຫ້ເຂົ້າກັນດີ

3. ເມື່ອຄົບເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ ນຳເອົານ້ຳຢືດທີ່ ປະສົມໄວ້ ເທລົງໃນຖັງອາຫານລ້ຽງເຊື້ອທີ່ກຽມໄວ້ ແລະ ເຕີມອອກຊີເຈນດ້ວຍການຄົນ ແລ້ວປະໄວ້ ປະມານ 30 ນາທີ

4. ບັນຈຸກາກມັນຕົ້ນລົງໃນອ່າງ ຫຼື ຖັງ ຫຼື ເປົາທີ່ມີ ຖົງຢ່າງດຳຮອງດ້ານໃນ

5. ໃສ່ກາກມັນຕົ້ນໃນອ່າງ ຫຼື ຖັງທີ່ກຽມໄວ້ ແລະ ເທນ້ຳໝັກຢືດທີ່ປະສົມແລ້ວລົງໃສ່ ຈາກນັ້ນ ປົດບໍ່ໃຫ້ ອາກາດເຂົ້າ ປະໄວ້ ປະມານ 10-20 ວັນ ຈຶ່ງເອົາໄປ ເກືອສັດ (ໝັກໄວ້ດົນທາດໂປຣຕິນຈະສູງຂຶ້ນ ເຊັ່ນໄລ ຍະເວລາໝັກ 10 ວັນ ຈະມີປະລິມານໂປຣຕິນ 12%, ໝັກໄວ້ 20 ວັນ ຈະມີປະລິມານໂປຣຕິນ 16%, ໝັກ ໄວ້ 30 ວັນ ຈະມີປະມານໂປຣຕິນເພີ່ມຂຶ້ນ 20%),

ລິການສັງເກດມັກຕົ້ນໝັກຢືດທີ່ດີ ຕ້ອງມີລັກສະນະ ສີນ້ຳຕານ, ເວລາດົມຈະມີກິ່ນຫອມກາກນ້ຳຕານປະ ສົມແອມໂມເນຍ ແລະ ມີລົດສົ້ມເລັກນ້ອຍ.

ກາກມັນຕົ້ນໝັກຢືດ ສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານ ຂອງງົວ, ຄວາຍ, ແບ້, ໝູ ແລະ ສັດປີກໄດ້ ໂດຍແນະ ນຳການໃຊ້ດັ່ງນີ້:

- ສຳລັບງົວແມ່ນສາມາດໃຊ້ເປັນອາຫານຫຼັກ ໂດຍໃຫ້ກິນເຕັມທີ່ໄດ້

- ສຳລັບໝູ ແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ເປັນສ່ວນປະສົມໃນ ອາຫານສຳລັບໝູແມ່ພັນ ແລະ ໝູລຸ້ນ-ຊຸນ ນ້ຳໜັກ ຕັ້ງແຕ່ 40 ກິໂລກຼາມ ຂຶ້ນໄປ ໃຫ້ໃນອັດຕາສ່ວນເຂັ້ມ ຊຸ້ມ 1 ສ່ວນ ຕໍ່ກາກມັນຕົ້ນໝັກຢືດ 2-5 ສ່ວນ

- ສຳລັບສັດປີກ ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ໃນຊ່ວງໄລຍະ ກາງ ໂດຍປະສົມກັບອາຫານທີ່ໃຊ້ມາກ່ອນ ແລະ ປັບ ປະລິມານເພີ່ມຂຶ້ນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ສົມທຽບຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານຂອງກາກມັນຕົ້ນໝັກຢືສ

ອົງປະກອບທາງເຄມີ	ກາກມັນຕົ້ນໝັກຢືສ	ກາກມັນຕົ້ນສົດ
ຄວາມຊຸ່ມ	79,1%	70,3%
ທາດຊີ້ນ	16,4%	2,8%
ພະລັງງານ	2,5 Mcal/Kg	2,8 Mcal/Kg
ເຢື່ອໄຍ %	20,7%	21,9%



ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນຄົ້ນຄວ້າການລ້ຽງສັດ, ສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ.

ຄຸນນະຮັບຜິດຊອບ:

ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ
ທ່ານ ນ. ສຸດາຄຳ ພິມມະສອນ

ບັນນາທິການ:

ທ່ານ ກິດຊະນະ ພິມມະຈັນ
ທ່ານ ໄຊລາ ສິມມະລາວົງ
ທ່ານ ນ. ທອງພຸດ ວົງພະຈັນ

ຈັດໜ້າອອກແບບໂດຍ:

ທ່ານ ນ. ສີອຳມອນ ໄຊຍະລາດ

ຕິດຕໍ່ ແລະ ລົງໂຄສະນາໄດ້ທີ່: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງ 021 410154;

website: www.maf.gov.la;



Facebook: ຂ່າວສານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ;



Youtube: ລາຍການກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້;