

ວາລະສານ



ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ປະຈຳ ອາທິດວັນທີ 19 ຫາ 23 ມິຖຸນາ 2023



ການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາປາກ

ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

ການລ້ຽງ ແລະ ຂະຫຍາຍພັນປາປາກ



ປາປາກເປັນປາທີ່ລົບຊ້ອນຢູ່ຕາມໜ້ານ້ຳ, ລຳຄອງໜອງບຶງ, ທີ່ມີກະແສນ້ຳໄຫຼຄ່ອຍໆ ຫຼື ນ້ຳນັ່ງເປັນປາທີ່ທົນທານ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ດີ 1000 ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕໜອງປາປາກແມ່ນ 25 - 32 ອົງສາ, ການກິນອາຫານຂອງປາປາກແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງໂຕປາຄື: ໃນເວລາປາແຕກອອກມາໄໝ້ 3 - 7 ມື້ ມັນຈະກິນຈຳພວກໄຮນ້ຳສັດ ແລະ ໄຮນ້ຳພືດທີ່ນ້ອຍກວ່າ ປາກຂອງມັນ ສ່ວນທີ່ມີຂະໜາດ 3 - 5 ຊັງຕີແມັດ ແໜ, ຈອກ, ແລະ ຈຳພວກຜັກຕ່າງໆ ສຳລັບປາທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ມັນຈະກິນຈຳນວນພວກພືດນ້ຳເຊັ່ນ: ໃບມັນຕົ້ນ, ມັນດ້າງ, ຫຍ້າຂົນ, ຫຍ້າປ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ. ປາປາກມັກຊອກກິນອາຫານໃນກາງເວັນຫຼາຍກວ່າກາງຄືນ.

ການລ້ຽງທ່ອມປາປາກ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານທີ່ດີມີຄຸນນະພາບຄວນລ້ຽງເອງ ໜອງທີ່ລ້ຽງພື້ນຖານຄວນເປັນໜອງດິນ ຂະໜາດ 400 - 600 ຕາແມັດ ຫຼື ປະມານ 1 ໄລ່ ໂດຍແຍກລ້ຽງລະຫວ່າງປາຜູ້ ແລະ ປາແມ່ ອາຫານທີ່ໃຫ້ກິນໂປຣຕິນປະມານ 30% ໃນອັດຕາ 20 % ພ້ອມທັງໃຫ້ອາຫານເສີມເຊັ່ນ: ປວກ,

ຂີ້ກະເດືອນ ແລະ ຫຍ້າຕ່າງໆທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງປາບໍ່ໃຫ້ຕຸ້ຍເກີນໄປ ແລະ ລະບົບນ້ຳໄຫຼ ເຂົ້າ-ອອກ ສະດວກຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ນ້ຳເຊື້ອມີການຈະເລີນເຕີມໂຕພ້ອມປະສົມພັນຕາມລະດູການໃຫ້ໄຂ່ແມ່ນກາງເດືອນພຶດສະພາ (ປາປາກສາມາດປະສົມພັນໄດ້ເດືອນມີນາ ຫາ ເດືອນກັນຍາ).

• ການຈຳແນກເພດ

ປາໂຕຜູ້: ຈະມີຮູບຮ່າງນ້ອຍກວ່າປາແມ່ ທ້ອງຈະແບນ ທ້ອງແຂງ ຖ້າເຮົາເອົາມືລອງຮີດເບົາໆ ທີ່ທ້ອງຈະມີນ້ຳສີຂາວຊຸ້ນຄ້າຍຄືກັບນ້ຳນົມໄຫຼອອກມາ ຫາກເອົາມືລູບຕາມແກ້ມຈະຮູ້ສຶກຊາມື

ໂຕແມ່ທີ່ສົມບູນ ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນແຕ່ເຮົາສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍເມື່ອເຖິງລະດູປະສົມພັນ ເຮົາຈະເຫັນທ້ອງຂອງໂຕແມ່ເບິ່ງແບນອອກເມື່ອເວລາເຮົາຈັບໂຕແມ່ຈະນັ້ມ ແລະ ມື້ນ, ສ່ວນໂຕຜູ້ເຮົາລູບຕາມແກ້ມ ແລະ ຄືຈະຮູ້ສຶກຊາກວ່າໂຕແມ່ ເຮົາຍັງສາມາດຮີດທ້ອງເບົາໆຈະເຫັນນ້ຳເຊື້ອສີຂາວໄຫຼອອກມາ.

• ວິທີການປະສົມພັນມີ 3 ຮູບແບບຄື:

1. ປະສົມພັນແບບທຳມະຊາດ

ວິທີນີ້ເປັນວິທີທຳອິດ ເຊິ່ງເອົາປາໂຕຜູ້ ແລະ ປາໂຕແມ່ປະສົມພັນກັນເອງຕາມທຳມະຊາດ ເມື່ອມັນປະສົມພັນກັນແລ້ວໃຫ້ຍ້າຍປາພໍ່ແມ່ພັນອອກຈາກໜອງ ແລ້ວເຮົາອະນຸບານປານ້ອຍເອງ.

2. ປະສົມພັນແບບເຄິ່ງທຽມ

ວິທີນີ້ປາໂຕຜູ້ ແລະ ປາແມ່ ທີ່ລ້ຽງໃນໜອງ ຫຼື ອ່າງ ເຮົາສາມາດຄວບຄຸມສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອໃຫ້ປາປະສົມພັນກັນໄດ້ດ້ວຍການກະຕຸ້ນສັກຢາຮໍໂມນ (ຢາກະຕຸ້ນເພດ) ແລ້ວປ່ອຍໃສ່ອ່າງໃຫ້ປະສົມພັນກັນເອງໂດຍອັນຕາການປ່ອຍປາແມ່ 1 ໂຕ ຕໍ່ປາໂຕຜູ້ 2 ໂຕ.

3. ປະສົມພັນແບບທຽມ

ຄັດເລືອກພໍ່ແມ່ພັນທີ່ມີຄວາມສົມບູນ, ແຂງແຮງ, ບໍ່ມີບາດແຜຕາມຮ່າງກາຍ, ອາຍຸ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ຈາກນັ້ນນຳເອົາພໍ່ແມ່ພັນມາພັກໄວ້ອ່າງປະສົມພັນປະມານ 4-6 ຊົ່ວໂມງ ຈຶ່ງສັກຢາຮໍໂມນ (ຢາກະຕຸ້ນເພດ) ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ໄຂ່ ແລະ ນ້ຳເຊື້ອສົມບູນ.



- ປະລິມານການສັກຢາ: ປາແມ່ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ 1 ຊີຊີ, ປາຜູ້ 1 ກິໂລກຼາມ ຕໍ່ 0,5 ຊີຊີ

- ຂັ້ນຕອນການຮີດໄຂ່ປະສົມນ້ຳເຊື້ອ: ເມື່ອສັກຢາໄດ້ 6-8 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ນຳເອົາປາໂຕແມ່ທີ່ສັກຢາແລ້ວຂຶ້ນມາເຊັດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຮີດໄຂ່ເບົາໆເມື່ອເຮົາຮີດໄຂ່ໄດ້ແລ້ວນຳເອົາປາໂຕຜູ້ມາເຊັດໃຫ້ແຫ້ງແລ້ວຮີດເອົານ້ຳເຊື້ອເບົາໆປະສົມກັບໄຂ່ ນຳໃຊ້ຂົນໄກ່ມາຄົນໃຫ້ນ້ຳເຊື້ອເພື່ອເຮັດໃຫ້ນ້ຳເຊື້ອໂຕຜູ້ປະສົມກັບໄຂ່ ແລ້ວເອົາໄປຝັກໃສ່ອ່າງ ຫຼື ກະຊັງທີ່ກຽມໄວ້. ໄຂ່ປາປາກຈະຝັກອອກມາເປັນໂຕນ້ອຍພາຍໃນ 8-12 ຊົ່ວໂມງ ຂຶ້ນກັບອຸນຫະພູມນ້ຳ ແລະ ອາກາດຂອງ



ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ຖ້າອຸນຫະພູມສູງກໍ່ເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຟັກແຕກອອກມາເປັນໂຕໄວຂຶ້ນ.

• ການອະນຸບານ

- ປາທີ່ແຕກອອກມາໃໝ່ໆມັນຍັງມີຖົງອາຫານຕິດຢູ່ທ້ອງຂອງມັນບໍ່ຄວນໃຫ້ອາຫານ

- ປານ້ອຍໄດ້ 3-5 ມື້ ເລີ່ມໃຫ້ອາຫານຈຳພວກໄຂ່ຕື່ມໃຫ້ເອົາໄຂ່ແດງ ຫຼື ໂຮ່ນ້ຳໃຫ້ມື້ລະ 3 ຄາບ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາລົງອະນຸບານໃສ່ໜອງໄດ້ເລີຍ, ຫຼັງຈາກປ່ອຍລົງໜອງແລ້ວຄວນໃຫ້ອາຫານທີ່ມີໂປຣຕິນສູງໃຫ້ສອງຄັ້ງຕໍ່ມື້ ເຊົ້າ-ແລງ ອະນຸບານຈົນໄດ້ 45 ມື້ ແລ້ວແຍກຂະໜາດລູກປາຈະລ້ຽງເປັນປາຊື້ນ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍ່ສາມາດຈຳໜ່າຍລູກປາໄດ້ເລີຍ.



ໂດຍ: ສູນພັດທະນາການປະມົງ (ສພປ), ສອບຖາມເພີ່ມເຕີມໂທ: 020 2246 5634, 020 5806 9889

A4S
ANSWER FOR SUCCESS



4Tree



ສະໜັບສະໜູນໂດຍ

ບຸ້ຍໂຟທຣີ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ເພີ່ມຜົນຜະລິດເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ຕ້ອງບຸ້ຍໂຟທຣີ
ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ຕົວແທນຈຳໜ່າຍທົ່ວປະເທດ ຂອງບໍລິສັດເອໂຟເອສລາວ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່
ບ້ານ ດົງປ່າແຫຼບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ:020 5961 6564; 020 5592 7332



ຄະນະຮັບຜິດຊອບ:

ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສິງຄາມ

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຫອມດາລາ

ບັນນາທິການ:

ທ່ານ ກິດຊະນະ ພິມມະຈັນ

ທ່ານ ໄຊລາ ສິມມະລາວົງ

ທ່ານ ນ. ທອງພຸດ ວົງພະຈັນ

ຈັດໜ້າອອກແບບໂດຍ:

ທ່ານ ນ. ສີອຳມອນ ໄຊຍະລາດ

ຕິດຕໍ່ ແລະ ລົງໂຄສະນາໄດ້ທີ່: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງ 021 410154;

website: www.maf.gov.la;



Facebook: ຂ່າວສານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊຸມນະບົດ;



Youtube: ລາຍການກະສິກຳແລະ ປ່າໄມ້;