ວາລະສານ

ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ປະຈຳ ອາທິດວັນທີ 03 ຫາ 07 ກໍລະກົດ 2023

ເຕັກນິກການປູກເຫັດນາງລົມ ແລະ ນາງຟ້າ ໃນຖົງຢາງ

ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ເຕັກນິກການປູກເຫັດ ນາງລົມ ແລະ ນາງຟ້າ ໃນຖົງຢາງ

ເຫັດນາງລົມ ແລະ ເຫັດນາງຟ້າ ມີຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານອາຫານສູງ ໂດຍສະເພາະທາດໂປຼຕີນ, ຄາໂບໄຮເດດ ແລະ ວິຕາມິນບໍ່ໜ້ອຍນອກນີ້, ເຫັດຍັງໃຫ້ປະລິມານແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ທາດແຄວຊ້ຽມ, ຟົດສະຟໍຣັດ, ໂປຼເຕຊ້ຽມ ແລະ ມີພະລັງງານຂ້ອນຂ້າງສູງ, ການຮັບປະທານເຫັດສາມາດປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມດັນສູງ.

1. ການປູກເຫັດນາງລົມ ແລະ ນາງຟ້າ ຄວນມີວິທີເລືອກສະຖານທີ່ແບບໃດ?

ເຫັດນາງລົມ ແລະ ເຫັດນາງຟ້າ ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນໄລຍະເປັນດອກ ໃນບ່ອນອາກາດທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມສູງ 80% ຂຶ້ນໄປ ຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງໂຮງເຮືອນໄວ້, ເພື່ອເກັບຄວາມຊຸ່ມ ພາຍໃນໂຮງເຮືອນເຮັດເປັນຊັ້ນ ຫຼື ເປັນຮ້ານບໍ່ຕ້ອງກຳນົດຮູບແບບຕາຍຕົວ ພຽງແຕ່ວາງຖົງກ້ອນເຊື້ອໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຖົງ ແລະ ສາມາດເກັບດອກເຫັດໄດ້ຢ່າງສະດວກ ແລະ ຫົດນ້ຳໄດ້ສະດວກ, ລັກສະນະຂອງໂຮງເຮືອນອາດເປັນໂຮງເຮືອນຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື ນ້ອຍກໍ່ໄດ້, ຫຼັງຄາມຸງດ້ວຍຫຍ້າແອ້ມດ້ວຍຝາໄມ້ເຮ້ຍ ຫຼື ຫຍ້າກໍ່ໄດ້ພື້ນຂອງໂຮງເຮືອນອາດປູດ້ວຍຊາຍ ຫຼື ເປັນພື້ນດິນທຳມະດາ ມີປະຕູເຂົ້າອອກໄດ້ສະດວກ, ໃນບໍລິເວນເຮືອນປູກເຫັດຄວນມີຮົ່ມໄມ້, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຊຸ່ມພາຍໃນໂຮງເຮືອນປູກເຫັດສະໝ່ຳສະເໝີ.

2. ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດ

- ຖົງຢາງກັນຮ້ອນ ຂະໜາດ 6x12 ຊັງຕີແມັດ ຫຼື 7x12 ຊັງຕີແມັດ, ປອກຄໍປາກຖົງ, ສຳລີ ຫຼື ຢອງຝ້າຍ, ຢາງມັດ, ຫົວເຊື້ອເຫັດໃນເມັດພືດ, ຫ້ອງເຂ່ຍເຊື້ອ, ຝາອັດ ຫຼື ເຈ້ຍອັດປາກຖົງ, ເຫຼົ້າ 90, ໝໍ້ໜຶ້ງຂ້າເຊື້ອ (ຟຸ້ຍ), ເຮືອນພັກຖົງ ແລະ ເຮືອນສຳລັບເປີດດອກເຫັດ.

3. ສູດສ່ວນປະສົມທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດ ດັ່ງນີ້:

- ຂີ້ເລື່ອຍໄມ້ເນື້ອອ່ອນ 100 ກິໂລກຼາມ (ໃຫ້ຮ່ອນເອົາເສດໄມ້ອອກ)
- ຮຳອ່ອນ 7 ກິໂລກຼາມ
- ເຂົ້າປຸ້ງນ 2 ກິໂລກຼາມ
- ປູນຂາວ 1 ກິໂລກຼາມ
- ຢິບຊຳ 1 ກິໂລກຼາມ
- ດີເກືອ 0,3 ກິໂລກຼາມ
- ຟູນາຍ 0,5 ກິໂລກຼາມ
- ນ້ຳ 65-70%

4. ຂັ້ນຕອນການປະສົມ

4.1 ເທຂີ້ເລື່ອຍຈາກນັ້ນໃສ່ຮຳ, ປູນຂາວ, ຢິບຊຳ,

ຟູມາຍ, ດີເກືອ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

4.2 ຈາກນັ້ນໃຊ້ນ້ຳທິດໃຫ້ທົ່ວ ແລະ ປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ ໃຫ້ຂີ້ເລື່ອຍມີຄວາມຊຸມ 65-70 % ວິທີກວດສອບແມ່ນໃຫ້ໃຊ້ມືກຳຂື້ນມາ ຖ້າກຳແລ້ວຂີ້ເລື່ອຍຈັບຕົວເປັນກ້ອນ ສະແດງວ່າຄວາມຊຸ່ມໄດ້ ແຕ່ຖ້າກຳແລ້ວແຫ້ງບໍ່ເປັນກ້ອນໃຫ້ໃສ່ນ້ຳເພີ່ມ ຫຼື ຖ້າມີນ້ຳໄຫຼອອກມາສະແດງວ່ານ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ໃຫ້ໃສ່ຂີ້ເລື່ອຍເພີ່ມ.

4.3 ຕັກຂີ້ເລື່ອຍທີ່ປະສົມອາຫານເສີມຕ່າງໆແລ້ວໃສ່ໃນຖົງທີ່ກຽມໄວ້ໃຫ້ເຕັມປາກຖົງ ຈາກນັ້ນອັດໃຫ້ແໜ້ນເປັນກ້ອນ ຖົງໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ປະມານ 0,8 ກິໂລກຼາມ.

4.4 ນຳຄໍປາກຖົງໃສ່ ແລ້ວໃຊ້ຢາງບ້ວງຮັດອັດດ້ວຍຝ້າຍ ຫຼື ສຳລີ ເອົາເຈ້ຍອັດທັບຮັດດ້ວຍຢາງບ້ວງອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.

4.5 ໃຊ້ຟຸ້ຍເພື່ອນຶ້ງເຊິ່ງສາມາດບັນຈຸຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດໄດ້ 100-110 ຖົງ, ສ່ວນທາງໃນໝໍ້ໃຫ້ເອົາໄມ້ເຮັດເປັນຕະແກງ, ເພື່ອຮອງຖົງ, ປະມານ 12-15 ຊັງຕີແມັດ, ນຳເອົາຖົງຂີ້ເລື່ອຍມາບັນຈຸໃສ່ໝໍ້ໜຶ້ງໂດຍລຽນຖົງທາງຕັ້ງໃຫ້ເຕັມຟຸ້ຍ ເອົາແຜ່ນຢາງປົກປາກໝໍ້ ແລ້ວເອົາເຊືອກມັດອ້ອມໃຫ້ແໜ້ນ, ເຈາະຮູຊ່ຳປາຍນິ້ວກ້ອຍໃສ່ແຜ່ນຢາງໃຈກາງໝໍ້ນຶ້ງເພື່ອໃຫ້ອາຍນ້ຳອອກ, ດັງໄຟໃສ່ໝໍ້ນຶ້ງສະໝ່ຳສະເໝີ ໃຫ້ອຸນຫະພູມ 95-100 ອົງສາ, ໃຊ້ເວລາປະມານ 2-3 ຊົ່ວໂມງ, ຖ້າໜຶ້ງໃນອຸນຫະພູມ 90-95 ອົງສາເຊ ໃຊ້ເວລາປະມານ 4-5 ຊົ່ວໂມງ ເມື່ອຄົບເວລາໃຫ້ນຳມາພັກໄວ້ໃຫ້ເຢັນ.

5. ວິທີຢອດເຊື້ອ ແລະ ບົ່ມເຊື້ອ

ຫຼັງຈາກກຽມກ້ອນເຊື້ອເຫັດແລ້ວ ໃຫ້ນຳຫົວເຊື້ອເຫັດທີ່ກຽມໄວ້ໂດຍເລືອກໃຊ້ຫົວເຊື້ອເຫັດທີ່ມີເສັ້ນໄຍຂະຫຍາຍຕົວເຕັມທີ່ໃນເມັດພັນພືດໃໝ່ ເພາະຫົວເຊື້ອເຫັດໃນໄລຍະນີ້ກຳລັງແຂງແຮງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ໄວ, ສະຖານທີ່ເຂ່ຍເຊື້ອຄວນເຂ່ຍໃນຫ້ອງທີ່ສະອາດ ແລະ ສາມາດ ປ້ອງກັນລົມ, ດັ່ງນັ້ນຄວນເຂ່ຍເຊື້ອໃນຕອນເຊົ້າ ແລະ ຕອນແລງ, ການ

ເຂ່ຍເຊື້ອເຫັດຄວນໃຊ້ເຂັມເຂ່ຍເຊື້ອລົນໄຟຕະກຽງເຫຼົ້າ 90 ແລ້ວ ປ່ອຍໃຫ້ໃຫ້ເຢັນເສຍກ່ອນ, ເອົາເຂັມເຂ່ຍເມັດພັນພືດທີ່ມີເຊື້ອເຫັດອອກຈາກກັນ (ສັ່ນ ຫຼື ຕີແກ້ວຫົວເຊື້ອເຫັດເພື່ອໃຫ້ເມັດພັນພືດອອກຈາກກັນ) ສະດວກໃນການເຂ່ຍເຊື້ອເຫັດໃສ່ຖົງກ້ອນຂີ້ເລື່ອຍໃສ່ປະມານ 15-20 ເມັດ ຕໍ່ຖົງ, ຈາກນັ້ນ ໃຊ້ມືຈັບປາກຖົງສັ່ນໆ 2-3 ເທື່ອເພື່ອໃຫ້ຫົວເຊື້ອເຫັດກະຈາຍອອກ ແລ້ວອັດຈຸກສຳລີດ້ວຍເຈ້ຍ.

- ຖົງເຊື້ອເຫັດທີ່ເຂ່ຍເຊື້ອຮຽບຮ້ອຍແລ້ວຄວນບົ່ມໄວ້ໃນຫ້ອງສະອາດ ຫຼື ຫ້ອງທີ່ບໍ່ມີລົມພັດ, ບໍ່ໃຫ້ຖືກແສງແດດ, ເຮັດເປັນຮ້ານຊັ້ນບົ່ມຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດ, ເສັ້ນໄຍເຫັດຂະຫຍາຍເຕັມຖົງປະມານ 3-4 ອາທິດ, ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນໄຍຮັດຕົວ ແລະ ມີການສະສົມອາຫານພ້ອມທີ່ຈະເກີດດອກ, ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດເຂົ້າໄປໃນເຮືອນປູກເຫັດ.

6. ການເອົາຖົງກ້ອນເຫັດເຂົ້າໂຮງເຮືອນປູກເຫັດ

ເມື່ອເສັ້ນໄຍເຫັດສີຂາວຂະຫຍາຍຕົວເຕັມຖົງແລ້ວ, ຈຶ່ງນຳເອົາຖົງກ້ອນເຊື້ອເຫັດທີ່ບົ່ມໄວ້ນັ້ນເຂົ້າເຮືອນປູກເຫັດ, ຈັດວາງເປັນແຖວຍາວຕາມຮ້ານທີ່ຈັດຕຽມໄວ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳເອົາເຈ້ຍ ແລະ ສຳລີ ອອກຈາກປາກຖົງໃຫ້ໝົດ, ເຮືອນຂະໜາດ 4x6 ແມັດສາມາດບັນຈຸຖົງກ້ອນເຊື້ອ ໄດ້ປະມານ 4.000 ຖົງ.

7. ການຫົດນ້ຳ

- ການໃຫ້ນ້ຳເຫັດຄວນສັງເກດຄວາມຊຸ່ມໃນອາກາດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວການໃຫ້ນ້ຳມື້ໜຶ່ງໃຫ້ປະມານ 2-3 ຄັ້ງ, ຄວນສີດພົ່ນໃຫ້ເປັນຝອຍໃສ່ເທິງຖົງເຫັດ, ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າປາກຖົງເຫັດຫຼາຍຈົນເກີນໄປເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອນເຊື້ອເຫັດເນົ່າໄດ້.

- ການເກັບດອກເຫັດໃຫ້ບິດເອົາໝົດຈຸກຂອງເຫງົ້າເຫັດ ຄ່ອຍບິດບໍ່ໃຫ້ຖົງເຫັດກະທົບກະເທືອນ, ອາຍຸຂອງດອກເຫັດປະມານ 1-2 ວັນ ກໍ່ສາມາດເກັບໄດ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ສູນພັດທະນາ ແລະ ບໍລິການດ້ານການກະເສດຫ້ວຍຊອນ-ຫ້ວຍຊົ້ວ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ:
ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ
ທ່ານ ສີສະຫວາດ ທອນດາລາ

ບັນນາທິການ:
ທ່ານ ກິດຊະນະ ພົມມະຈັນ
ທ່ານ ໂຊລາ ສົມມະລາວົງ
ທ່ານ ນ. ທອງພຸດ ວົງພະຈັນ

ຈັດໜ້າອອກແບບໂດຍ:
ທ່ານ ນ. ສີອຳພອນ ໄຊຍະລາດ

ຕິດຕໍ່ ແລະ ລົງໂຄສະນາໄດ້ທີ່: ພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງ 021 410154;
website: www.maf.gov.la;
Facebook: ຂ່າວສານກະສິກຳ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ;
Youtube: ລາຍການກະສິກຳ;ແລະ ປ່າໄມ້;